

اسم الطالب	رزكار خليل عبد الله ميروا
عنوان الرسالة	تقييم معارف واتجاهات وممارسات الممرضين تجاه قرحة الفراش
Assessment of Nurse's Knowledge, Attitudes and Practice Towards Pressure Ulcer	

الخلاصة

قرحات الفراش إحدى المضاعفات الشائعة في الردهات التي يمكن تجنبها ، تكثر بين المرضى المسنين والذين يعانون من العوق البدني والشلل. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم معارف وممارسات وتوجهات الممرضين والمرضات تجاه قرحات الفراش ، وتحديد العلاقة بين هذه المعارف والتوجهات والممارسات لدى الممرضين ومقارنتها مع بعض المتغيرات السكانية والشخصية وكشف المعوقات لتجنب الإصابة بقرحات الفراش .

تم تصميم دراسة وصفية لتقييم المعارف والتوجهات والممارسات لدى الممرضين في مستشفيات الموصل التعليمية (مستشفى الجمهوري التعليمي ومستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى السلام التعليمي ومستشفى الموصل العام) وكان عدد الممرضين (1088) ممرض وممرضة في المستشفيات الأربعة ، تم اختيار (250) ممرض وممرضة كعينة عمدية من الذين يقومون فعلياً بتقديم الخدمات التمريضية والجراحية والعناية الفائقة في هذه المستشفيات ، لجمع للبيانات استخدمت استمارة استبانة ومقابلة شخصية لتحديد معارف الممرضين بالإضافة إلى قائمة اختيارات ومقياس لتحديد توجهات وممارسات الممرضين. تم تحديد ثبات الأداة عن طريق لجنة تتكون من (20) عشرين خبيراً من ذوي الاختصاصات المختلفة وثقي الصلة بالدراسة ، راجعوا استمارة الاستبانة لتحديد وضوحها وملائمتها لغرض الوصول إلى أهداف الدراسة والتأكد من تقييم معارف واتجاهات وممارسات الممرضين بوضوح ودقة .

تم تحضير وتنظيم البيانات ومعالجتها بالحاسوب وفق برنامج خاص (إحصائي علمي اجتماعي) [SPSS] ، تبين أن أعلى نسبة من المشمولين بالدراسة (90%) من الذكور ونصف المشمولين تتراوح أعمارهم بين (21- 25 سنة) وأكثر من نصف المشمولين بالدراسة خريجي المعهد التقني الطبي و (51.6%) من الممرضين لا تزيد خدمتهم الوظيفية على (5 سنوات) ، أظهرت النتائج أن الممرضين يملكون معارف متوسطة إلى عالية بالعلامات والأعراض المبكرة لعوامل لقرحات الفراش مع وجهات نظر إيجابية للوقاية من قرح الفراش. مع نقص في الممارسات التمريضية في الوقاية ومعالجة قرحات الفراش. ولهذا يوصي الباحث إقامة برنامج تعليمي وورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع إدارات المستشفيات ودائرة الصحة وكليات التمريض وكليات الطب ومنظمة الصحة العالمية لغرض تدريب الممرضين وتقييم أدائهم وإرسال بعضهم إلى خارج العراق للتعرف على آخر ما استجد في طرق الوقاية والعلاج .

Abstract

Pressure ulcer represents a common but potentially preventable condition seen most often in high-risk populations such as elderly persons and those with physical impairments. The study attempts to assess nurses' Knowledge, Attitudes and Practice toward PUs ; to identify the relationship of nurses' knowledge ,practice and attitudes in preventing PUs with some demographic variables and to find out nurses' barrier in preventing PUs. A descriptive study is designed to assess nurses' knowledge , practice and attitudes at the main Mosul Teaching Hospitals (Al Jumhory Teaching Hospital, Ibn Sina Teaching Hospital, AL Salam Teaching Hospital and Al Mosul Teaching Hospital). The target population was nurses selected out of (1088) nurses in the four hospitals, (250) nurses participated in the study according to the criteria of the study. A non-probability sampling (purposive sample) was used for selecting nurses from these four hospitals who are giving nursing care to patients admitted to hospitals for surgery or to receive medical care. For a proper collection of data the following tools are used; a questionnaire, interview format to determine nurses' knowledge, and observation check list were used to determine the practice, and a scale were used to examine the nurses attitudes. The validity of the instrument was established through a panel of (20) experts of different specialties related to the field of the present study. They were asked to review the questionnaire for clarity and adequacy in order to achieve the present study objective. Reliability of the questionnaire represented by a pilot study revealed that the tools used in assessing the KAP were clear to understand and comprehensive .

Data are prepared, organized and entered into a computer file; Statistical Package for the Social Science (SPSS, version 15) is used for data analysis. Based on the results, it can be mentioned that a high percentage of nurses involved in the study was males, and most of the nurses' age ranged between (21-25) years. The majority of the nurses graduated from Technical Medical Institute (51.6%). The majority of nurses have experience of (2-5) years in nursing since their employment. Also the result shows that the nurses had middle to high knowledge concerning risk factors early sings and symptoms , prevention, position devices, protective devices for Pressure Ulcer prevention. In addition to positive attitudes concerning Pressure Ulcers prevention. But there deficiencies in nursing practice in Pressure Ulcers prevention. The researcher recommends that an educational program regarding prevention of PUs should be established in collaboration with Health Governorate , medical colleague , nursing colleague and World Health Organization (WHO) for nurses in hospitals or they should be sent abroad for training. Establish a committee in the hospitals to evaluate nurse's performance.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.